

بررسی فونستیک مگس‌های خانواده سیرفیده (Dip., Syrphidae)

در نیمه شرقی استان زنجان

معصومه ندرلو^{۱*}، شاهرخ پاشایی راد^۲، محمد ولی تقدسی^۳

۱- دانش آموخته بیوسیتماژیک جانوری، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

۲- استادیار، گروه جانوری، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

۳- عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان

چکیده

به منظور مطالعه فونستیک مگس‌های خانواده سیرفیده طی سال‌های ۱۳۸۷-۱۳۸۸ در نیمه شرقی استان زنجان، نمونه‌های بالغ این حشرات جمع‌آوری و شناسایی شدند. در مجموع، ۳۱ گونه، متعلق به ۱۶ جنس از دو زیرخانواده جمع‌آوری شدند. بین این نمونه‌ها، ۲۸ گونه به شرح زیر برای اولین بار از استان زنجان و نمونه مشخص شده با ستاره برای اولین بار از ایران گزارش می‌شود.

Subfamily: Syrphinae

*Spazigaster ambulans** (Fabricius, 1798), *Melanostoma mellinum* (Linnaeus, 1758), *Platycheirus* sp., *Paragus albifrons* (Fallen, 1817), *Paragus bicolor* (Fabricius, 1794), *Paragus abrogans* Goeldlin de Tiefenau, 1971, *Sphaerophoria rueppelli* (Wiedemann, 1830), *Sphaerophoria scripta* (Linnaeus, 1758), *Sphaerophoria turkmenica* Bankowska, 1964, *Ischiodon scutellaris* (Fabricius, 1805), *Scaeva pyrastris* (Linnaeus, 1758), *Scaeva albomaculata* (Macquart, 1842), *Episyrphus balteatus* (DeGeer, 1776), *Eupeodes nuba* (Wiedemann, 1830), *Meliscaeva auricollis* (Meigen, 1822)

Subfamily: Milesiinae

Eumerus strigatus (Fallen, 1817), *Eumerus sogdianus* Stackelberg, 1952, *Helophilus continuus* Loew, 1854, *Eristalis tenax* (Linnaeus, 1758), *Eristalis arbustorum* (Linnaeus, 1758), *Eristalis similis* Fallen, 1817, *Eristalinus taeniops* (Wiedemann, 1818), *Eristalinus megacephalus* (Rossi, 1794), *Eristalinus sepulchralis* (Linnaeus, 1758), *Eristalinus aeneus* (Scopoli, 1763), *Pipizella divicoi* (Goeldlin de Tiefenau, 1974), *Neoascia podagrica* (Fabricius, 1775), *Syrirta pipiens* (Linnaeus, 1758).

واژه‌های کلیدی: فون، سیرفیده، گزارش جدید، زنجان، ایران

*نویسنده رابط، پست الکترونیکی: ma.naderlu@gmail.com

تاریخ دریافت مقاله (۸۹/۱۰/۱۶) - تاریخ پذیرش (۹۰/۲/۲۵)

